

**FASE FENOLOGICA: Pre fioritura**



**INTERVENTI CULTURALI:**

- **POTATURA**

Si raccomanda di **SOSPENDERE LE OPERAZIONI DI POTATURA**

- **CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO**

- Negli areali in cui non è ancora iniziata la fioritura è ancora possibile eseguire concimazioni fogliari con boro. Questo microelemento infatti, è essenziale per la produzione di olive, in quanto migliora la vitalità del polline e il processo riproduttivo, riducendo la cascola dei frutticini (olive). La carenza di boro determina gravi problemi nella germinazione del polline, nello sviluppo del tubetto pollinico e nell'allegagione (minor produzione di olive).
- Tale microelemento inoltre, è necessario per la formazione di auxine e lignina, fondamentali per rendere la pianta resistente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali (es. gelate, siccità, ecc.).
- Spesso, anche se il boro è presente nel terreno, le piante non riescono ad assorbirlo in modo sufficiente: per questo motivo la concimazione fogliare risulta molto utile. In particolare, nel caso di terreni alcalini ( $\text{pH} > 7$ ), l'apporto di boro per via fogliare, diventa fondamentale per garantire produzioni elevate e di qualità. È buona norma quindi, intervenire in fase di mignolatura con una concimazione fogliare a base di Boro. **Ricordiamo che esistono formulazioni di Boro impiegabili anche in agricoltura biologica.**
- Si raccomanda di rispettare le dosi d'impiego riportate in etichetta e di verificare la compatibilità prima di miscelarlo con altri prodotti. Se necessario è opportuno effettuare un secondo intervento dopo la caduta dei petali.





**Società Cooperativa Agricola**

## **TRATTAMENTI FITOSANITARI**

Come norma generale, SI CONSIGLIA DI RIMANDARE I TRATTAMENTI A BASE DI RAME ALLA FASE DI POST ALLEGAGIONE, tranne nelle aree dove si sono verificati significativi danni da grandine.

- **SPECIALE GRANDINE**

Al fine di contenere le infezioni di Rogna, negli areali colpiti da grandine e solo dove vengono riscontrate lesioni su legno ricordiamo di intervenire tempestivamente con prodotti rameici. Inoltre informiamo che il trattamento va eseguito SOLO IN CASO DI FIORI BEN CHIUSI.

- **FUNGHI**

OCCHIO DI PAVONE E ANTRACNOSI:

Dato l'andamento stagionale piovoso, le osservazioni in campo dei nostri tecnici mostrano **la presenza di sintomi di Occhio di Pavone** (Cicloconio - *Cyloconium oleaginum*), **Piombatura** (*Mycocentrospora cladosporioides*) e di **Lebbra** (Antracnosi - *Colletotrichum spp.*), in particolar modo negli oliveti dove **non** è stato effettuato il **trattamento cuprico** dopo la raccolta.

Qualora l'attacco di occhio di pavone fosse presente in percentuali superiori al 30% informiamo che è ancora possibile intervenire con un prodotto curativo a base di "Tebuconazolo" e/o "Strobilurine". Ricordiamo che questi prodotti sono miscelabili con il Boro.

In generale, le strategie di lotta consigliate contro queste tipologie di patogeni sono basate sulle **corrette pratiche agronomiche**, in particolare effettuare correttamente e tutti gli anni le potature nel giusto periodo, favorendo l'arieggiamento e l'illuminazione delle chiome.

**Per ogni dubbio, o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL  
scrivendo a: [info@aipol.bs.it](mailto:info@aipol.bs.it)**