



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

ZONA LARIO - BOLLETTINO OLIVO del 09-05-2011

Fase fenologica: ripresa vegetativa-mignolatura

Interventi culturali:

POTATURA

Ove non ancora terminate, sospendere al più presto le operazioni di potatura. Terminata la potatura si consiglia di effettuare un trattamento con prodotti a base di rame, seguendo i dosaggi riportati in etichetta, per disinfettare i tagli e prevenire le infezioni di Occhio di Pavone e di Piombatura, prima della fioritura.

CONCIMAZIONE:

in questo periodo si può intervenire con la concimazione azotata come riportato nel precedente bollettino zona Lario dell'8 aprile 2011.

Negli oliveti dove si manifesta una regolare scarsa allegazione o si osservano sulla vegetazione sintomi da carenza di boro (clorosi, foglie a lembo irregolare, scarso sviluppo degli internodi, ingrossamento dei nodi, formazione di scopazzi e disseccamenti apicali), si consiglia di intervenire con un trattamento fogliare con un concime a base di boro.

È fondamentale seguire rigorosamente le dosi indicate in etichetta, poiché un eccesso di dosaggio del prodotto può portare a cascola dei fiori.

Nelle aree dove non si manifesta ancora la mignolatura, a ripresa vegetativa più tardiva, attendere ancora una-due settimane prima di trattare.

Solo nel caso di sintomi conclamati di borocarenza si consiglia di ripetere il trattamento anche dopo la fioritura, a seguito della caduta dei petali.