



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

BOLLETTINO OLIVO del 28-07-2011

FASE FENOLOGICA

Indurimento del nocciolo.

DIFESA FITOSANITARIA

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE

In questo periodo le neanidi (forme giovanili dell'insetto) iniziano ad uscire dagli scudetti materni, quindi negli oliveti in cui si è superata la soglia d'intervento di 2-5 neanidi/foglia, controllando un campione di 100 foglie prese a caso, si consiglia di trattare con **oli minerali estivi** cui si può aggiungere il regolatore di crescita **Buprofezin** da distribuire nelle ore più fresche della giornata, in modo da non provocare ustioni fogliari. Durante l'intervento bisogna "bagnare bene" la pianta soprattutto la pagina inferiore delle foglie. In caso di presenza di fumaggine si può aggiungere un prodotto a base di rame. E' infine opportuno ricordare che ricorrere a trattamenti chimici, nei momenti sbagliati, spesso è la causa del maggior sviluppo di quest'insetto, perché si colpiscono solo i predatori e parassiti utili e non le neanidi che rimangono protette dallo scudetto materno.

MOSCA DELLE OLIVE

I rilievi effettuati con le trappole cromotropiche a feromoni manifestano catture insignificanti, pertanto non si consiglia alcun trattamento.

OPERAZIONI CULTURALI

GESTIONE DEL TERRENO

Per evitare competizioni idriche fra piante ed infestanti, si consiglia di eseguire regolarmente gli sfalci nei terreni inerbiti.

POTATURA VERDE

Si consiglia di eliminare eventuali succhioni e polloni sia su piante giovani in fase di allevamento sia su piante adulte.