



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia Reg. C.E. 867/08

ZONA LARIO - BOLLETTINO OLIVO del 07-10-2010

Fase fenologica: inizio invaiatura cultivar precoci

Difesa fitosanitaria:

Si conferma la situazione della settimana scorsa, con il riscontro della presenza di punture di mosca olearia sopra soglia di tolleranza soprattutto nelle zone ben esposte e a quote basse, prevalentemente in prossimità del bacino lacustre.

Si consiglia quindi di intervenire con un prodotto curativo (principi attivi Dimetoato e Imidacloprid) negli oliveti situati a quote basse e ben esposti, dove non siano state posizionate trappole per la cattura massale (“attract and kill”) e nei quali si preveda di raccogliere non prima del superamento del tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) degli insetticidi suddetti, da controllare in etichetta, che è di solito di 28-35 giorni.

Vista la situazione non omogenea, verificare comunque nell'oliveto il superamento della soglia di tolleranza di almeno il 10 % di olive con puntura fertile (prelevando 100 olive a caso da diverse piante) prima di intervenire.

L'eventuale trattamento non va' ulteriormente ritardato, ma realizzato entro qualche giorno.

Nella maggior parte degli oliveti, dove le punture sono sporadiche o non è ancora stata raggiunta la soglia di intervento, si consiglia di non trattare.

Anche nel caso si verifichi un aumento delle punture nelle prossime settimane, si suggerisce di non intervenire con trattamenti chimici curativi, ma di raccogliere con un tendenziale anticipo, in modo da limitare i danni all'oliva.

Il tecnico dr. Borelli (tel. 339-8027022) è a disposizione per consigliare al meglio, a seconda della zona e dell'entità dell'infestazione, le strategie di difesa da approntare.

SEDE OPERATIVA Viale della Bornata, 110 - 25123 Brescia

SEDE LEGALE Via S. Zeno, 69 - 25124 Brescia

Tel 030/3757880 Fax 030/3375899

e-mail aipol@libero.it – www.aipol.bs.it