

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA

PAROLE CHIAVE:

MOSCA OLIVO,
MARGARONIA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

02-10-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Tempo sereno per tutta la settimana, con **temperature nella media stagionale**.

Le **olive** si presentano **ancora ben idratate** e non mostrano segni di stress idrico. **Tutte le varietà si trovano** nella **fase fenologica di invaiatura**, con un **viraggio più rapido nel Leccino**. Le **prove di maturazione** condotte questa settimana evidenziano un **rapido aumento degli indici colorimetrici nel Leccino (2,03-2,71)**, mentre la **Casaliva** presenta ancora la **maggior parte delle drupe di colore giallo-verde (1,09)** parametri quindi **ancora lontani da quelli ottimali** per avviare le operazioni di raccolta. La popolazione di **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*), **risulta essere in calo**. Le **condizioni climatiche continuano a favorire sia l'ovideposizione sia il volo di mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*). La tendenza attuale evidenzia una **diminuzione delle catture di adulti nelle trappole**. Negli oliveti monitorati si rilevano **sporadiche ovideposizioni fertili**, oltre ad alcune larve di seconda e terza età; tuttavia, **non è stata registrata un'infestazione attiva superiore alla soglia d'intervento**. Per quanto riguarda l'**Euzophera**, le **catture di adulti si mantengono su livelli molto contenuti** per entrambe le specie. Si segnala invece **un aumento di margaronia** (*Palpita unionalis*), sia sulle piante in produzione sia nei giovani oliveti, con danni che hanno superato la soglia d'intervento. Si registrano inoltre sporadici attacchi sulla drupa da parte di una piccola cocciniglia (*Parlatoria oleae*), che provoca tacche tondeggianti colorate; la sua presenza, in ogni caso, non desta preoccupazione e non richiede attualmente interventi specifici. **Le condizioni climatiche** di questa settimana **sono meno favorevoli agli attacchi fungini** data la mancanza di precipitazioni e la progressiva diminuzione dell'umidità relativa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si consiglia di **proseguire con la normale gestione del cotico erboso**.

In **vista del periodo propizio per la raccolta delle olive**, è opportuno **iniziare a controllare il materiale utilizzato**, per assicurarsi che tutto sia funzionante.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Gli **attacchi di mosca dell'olivo risultano sporadici**; si raccomanda comunque di **verificare con attenzione la presenza di eventuali punture** di ovideposizione e, **qualora ve ne fossero, di procedere alla stima dell'infestazione attiva** tramite il campionamento di 100 drupe, controllando con cura sia le punture di ovideposizione sia la presenza di uova e larve vitali in sviluppo. Nel caso in cui **l'infestazione attiva superi la soglia d'intervento (3%)**, è importante tenere presente che in questa fase **gli interventi di contenimento della mosca risultano più delicati**: **avvicinandosi alla raccolta**, è fondamentale rispettare i tempi di carenza dei prodotti e, **qualora fosse necessario eseguire un trattamento**, si **consiglia di utilizzare prodotti ovo-larvicidi con i tempi di carenza più brevi possibile**.

Si **consiglia di monitorare la presenza di margaronia** (*Palpita unionalis*); **in caso di danno diffuso** sia ai germogli sia alle drupe, è **possibile intervenire con un trattamento a base di *Bacillus thuringiensis***, ricordando di acidificare l'acqua utilizzata qualora risulti troppo calcarea. Si precisa inoltre che **margaronia viene controllata anche dagli ovolarvicidi** impiegati **per il contenimento della mosca dell'olivo**.

Nello specchio riportato di seguito vengono riassunti i trattamenti consigliati.

MOSCA DELL'OLIVO	
TRATTAMENTI OVOLARVICIDI (al superamento della soglia 3%)	
CONVENZIONALE	Acetamiprid, Flupyradifurone
BIOLOGICO	Azadiractina A
N.B. Utilizzare i prodotti con tempo di carenza più breve possibile	
MARGARONIA	
Utilizzo di prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	
N.B. I trattamenti per mosca dell'olivo contengono anche margaronia	

Si ricorda di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari, rispettando le dosi massime e minime d'impiego, i tempi di carenza e le modalità di applicazione.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Tacca colorata causata da *Parlatoria oleae* - areale Garda



Uovo di mosca dell'olivo - areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica dominante è quella dell'invaiaitura, o inolizione**. La **colorazione delle drupe sta virando** con intensità variabile a seconda della cultivar, dell'esposizione e della precocità dei singoli oliveti. Contemporaneamente, **l'accumulo di olio nella polpa prosegue** ed è ormai in fase avanzata.

Le condizioni climatiche, continuano a risultare favorevoli all'attività della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) e all'ovideposizione. Rispetto alla scorsa settimana, nei **monitoraggi effettuati negli oliveti del Sebino e della Franciacorta si registra un aumento delle catture di adulti di mosca dell'olivo.**

I campionamenti diretti delle drupe evidenziano un leggero aumento delle larve di prima età. Nonostante l'incremento delle catture e delle larve di prima età, gli oliveti monitorati non hanno superato la soglia d'intervento. Si consiglia comunque di **mantenere elevata l'attenzione**, soprattutto negli oliveti più precoci, freschi e umidi e negli appezzamenti in cui la raccolta è prevista più avanti nella stagione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare con la **normale gestione del cotico erboso.**

CONSIGLI AGRONOMICI

È importante **proseguire con un monitoraggio frequente delle trappole**, verificando l'evoluzione delle catture, e intensificare il **campionamento diretto delle olive**. Nei campioni è necessario distinguere le punture sterili da quelle fertili e **verificare soprattutto la presenza di uova e larve vive di prima età**, così da **determinare l'effettiva percentuale di infestazione attiva** e seguirne l'evoluzione.

Per la difesa ovo-larvicida, la sporadica presenza di larve di prima età rende particolarmente importante **valutare l'infestazione attiva nei singoli oliveti**. Eventuali interventi non devono essere generalizzati, ma decisi sulla base dei risultati dei campionamenti e delle soglie previste dai disciplinari.

Considerata la fase avanzata della stagione e il progressivo avvicinamento alla raccolta, l'eventuale utilizzo di prodotti autorizzati a base di **acetamiprid o flupyradifurone** dovrà **essere attentamente valutato** verificando tempi di carenza, numero massimo di applicazioni consentite e data prevista di raccolta.

In questa fase si consiglia inoltre di privilegiare, ove possibile, **i prodotti con il tempo di carenza più breve**, così da **garantire un margine di sicurezza maggiore rispetto alla raccolta e ridurre il rischio di superare i limiti di residuo consentiti.**

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella dell'**inolizione/invaiatura**.

In questi giorni le olive stanno **immagazzinando sempre più olio** e stanno **raggiungendo uno stadio di maturazione ottimale**. È necessario cominciare a **programmare i giorni per la raccolta**, cercando di **partire dalle zone e dalle varietà più precoci**, come nelle **zone dell'alta Brianza** e negli **oliveti meglio esposti sul lago**. **Se fosse possibile** raccogliere separatamente le varietà, sarebbe buona cosa **partire da leccino e pendolino**, per poi spostarsi sul frantoio.

La **pressione di mosca resta presente**, ma **il fitofago non desta preoccupazioni nella maggior parte dei casi**, con un'infestazione attiva sotto la soglia d'intervento.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Procedere alla **normale gestione del cotico erboso**, in preparazione alla raccolta. **L'assenza di acqua dell'ultimo periodo potrebbe portare ad avere in lavorazione paste molto asciutte**, per chi ne avesse la possibilità, è **consigliabile irrigare moderatamente le piante**, fermandosi qualche giorno prima della **raccolta**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda di **sospendere tutti i trattamenti fitosanitari**, così da rispettare i tempi di carenza dei prodotti.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal 17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

DEROGA DELTAMETRINA

Si comunica che Regione Lombardia ha autorizzato, per il 2026, un intervento all'anno con Deltametrina su olivo per il controllo di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica). La deroga è valida su tutto il territorio regionale per le aziende che aderiscono a SQNPI, PAC (SRA01) o OCM. Rispettare obbligatoriamente le indicazioni di etichetta.