

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

ACCRESIMENTO
FRUTTO

PAROLE CHIAVE:

CASCOLA
PATOLOGICA, CIMICE
ASIATICA

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

11-07-2025

Prossimo bollettino 18-07-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Settimana caratterizzata da temporali anche di forte entità, con una netta diminuzione delle temperature sia massime che minime. La fase fenologica rilevata è **accrescimento del frutto** e cominciano a vedersi i primi segnali dell'indurimento del nocciolo soprattutto nelle varietà da tavola e più precoci. I **fitofagi secondari** sono presenti ancora in maniera sporadica e **non si segnalano casi in cui sia necessario un intervento fitosanitario specifico**.

I tecnici continuano a rilevare la presenza di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*) associata a **fenomeni di cascola patologica** sia nelle **zone del basso Garda**, sia in alcune località della **Valtenesi** e anche in alcune località dell'**Alto Garda** anche se la situazione in tutti e tre gli areali risulta essere eterogenea.

Anche se le temperature si sono abbassate e questa settimana ci sono stati numerosi temporali, attualmente non si segnalano problematiche legate a patogeni fungini.

Sono presenti **fenomeni di disseccamento delle drupe (drupe annerite che molte volte rimangono attaccate alla pianta)** che non presentano gli stessi sintomi delle olive attaccate da cimice asiatica, in questo caso la sintomatologia è **da ricondurre alle alte temperature** rilevate la settimana scorsa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si rinnovano i consigli agronomici della settimana scorsa, **si consiglia per tutelare gli insetti pronubi (api e apoidei)**, fondamentali per l'impollinazione e la biodiversità, di **adottare strategie fitosanitarie e gestionali che ne riducano l'esposizione ai trattamenti insetticidi**. Prima dell'applicazione, in caso di fioriture, è opportuno **effettuare lo sfalcio della vegetazione**, preferibilmente in ore serali o mattutine, quando l'attività di volo degli apoidei è assente. Inoltre, è cruciale **limitare la deriva dei prodotti fitosanitari**, evitando la contaminazione di siepi fiorite, colture marginali e flora spontanea adiacente all'area trattata.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Negli oliveti in cui si è trattato la cascola verde si è arrestata, si segnala che in alcune località della Valtenesi (Manerba e Picedo su tutte si sono trovati oliveti con presenza dell'insetto e forte cascola) per l'alto Garda si segnala che oliveti nelle località di Salò, Toscolano, Gargnano presentano sintomi di cascola patologica attribuibile a cimice.

Anche questa settimana si consiglia a tutti gli olivicoltori gardesani di monitorare la situazione in campo e in caso di presenza dell'insetto e di cascola patologica di procedere il prima possibile ad un intervento fitosanitario.

In caso di necessità contattare i tecnici per un consulto.

Si ricorda che al momento, gli unici principi attivi registrati contro la *cimice asiatica* (*Halyomorpha halys*) e utilizzabili su olivo sono la **deltametrina** e il **piretro naturale**. Altri prodotti che contengono il p.a. Acetamiprid e registrati su olivo per Mosca (*Bactrocera oleae*), Tignola (*Prays oleae*), Sputacchina (*Philaenus spumarius*) e Cecidomia fogliare dell'olivo (*Dasineura oleae*) hanno un'azione collaterale anche su *cimice asiatica* ma non sono registrati per questo fitofago. I principi attivi utilizzabili e registrati sono riassunti nello specchietto sottostante.

Si ricorda che in caso di grandinate per evitare la diffusione di rogna è necessario intervenire con trattamenti a base di prodotti rameici.

TRATTAMENTI CIMICE ASIATICA	
CONVENZIONALE	Prodotti a base di Deltametrina
BIOLOGICO	Prodotti a base di Piretrine naturali *

*si consiglia di acidificare la soluzione durante la preparazione della miscela.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Neanide di terza età di cimice asiatica-areale Garda



Neanide di seconda età di cimice asiatica-Areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **accrescimento dei frutti**

Si continua a rilevare una **presenza limitata di adulti di cimice asiatica** si sono invece rilevate ancora **nuove ovature** e la presenza **di neanidi di 2° età e ninfe di 1° e 2° età** nella pressoché totalità degli areali monitorati. La **cascola patologica** presenta ancora una **moderata intensità** con lievi danni in zone precoci o laddove i carichi produttivi sono limitati. Non si segnala la presenza di adulti di mosca dell'olivo. Sono presenti gli adulti di cocciniglia mezzo grano di pepe ma non si è ancora rilevata la presenza di neanidi, tuttavia verificare negli areali meglio esposti la presenza delle stesse. L'intensità della cascola verde è in misura variabile in relazione alle zone considerate, ma si rileva sempre una maggior intensità su varietà Leccino, meno presente su Frantoio e Pendolino.

SITUAZIONE FITOSANITARIA


Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Anche questa settimana si suggerisce l'impiego di **trattamenti abbattenti nei confronti di *Halyomorpha halys*** solamente **in concomitanza del rinvenimento dell'insetto** (più frequente ninfa di 1° e 2° stadio). In presenza di rinvenimento di esemplari di cimice asiatica resta comunque **il consiglio di contattare il tecnico prima di effettuare interventi fitosanitari**. Controllare eventuali deposizioni di mosca dell'olivo negli oliveti meglio esposti.

Effettuare **interventi con ossicloruro di rame** nel caso si verifichino **eventi grandinigeni**. Ricordiamo che i trattamenti rameici vanno eseguiti al di sotto dei 30°C.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Sebino



Fase fenologica- areale Sebino

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **pre- indurimento del nocciolo-accrescimento dei frutti**

Il caldo delle ultime settimane ha portato ad una **progressiva velocizzazione dello sviluppo fenologico dell'olivo**. Nelle **zone più precoci si rileva il pre-indurimento del nocciolo** delle drupe mentre nelle **zone più fresche** si è ancora nella fase di **accrescimento dei frutti**. Il brusco calo delle temperature degli ultimi giorni ha creato **condizioni favorevoli all'ovideposizione della mosca dell'olivo**, si rilevano soprattutto su varietà da mensa ma in alcuni casi anche su frantoio e leccino **le prime punture per la maggior parte sterili** ma **sporadicamente** con **la presenza di uova e larve di prima età dell'insetto**. Negli oliveti in cui non è stato fatto alcun un trattamento per contenere cimice asiatica i danni causati dall'insetto si attestano tra il 30-40% delle drupe cascolate, mentre dove è stato effettuato il trattamento i danni risultano contenuti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Effettuare con regolarità gli sfalci del manto erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

È possibile cominciare a adottare **delle misure di difesa preventiva** contro la **mosca dell'olivo**, con l'utilizzo di **tecniche attract and kill** (esche proteiche avvelenate) o con **prodotti di repellenza** (caolino, zeolite, polvere di basalto, etc.).

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che la **CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027**, all'Operazione **10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo all'utilizzo in deroga alle **Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo**:

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum spp.*);

Per la sostanza attiva deltametrina si specifica che è concessa la deroga per un solo intervento fitoiatrico.