

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA

PAROLE CHIAVE:

MOSCA OLIVO,
MARGARONIA,
MALATTIE FUNGINE

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

25-09-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Nell'**ultima settimana il tempo è stato sereno**, con **temperature leggermente inferiori** alla norma.

Nonostante l'assenza di precipitazioni, **gli oliveti non mostrano segni di stress idrico** e le **drupe risultano ben idratate**. La **fase fenologica** è quella **dell'invaiaura** per tutte le varietà. **Le prime prove di maturazione** dell'oliva, eseguite sulle varietà precoci, **evidenziano che gli indici colorimetrici sono ancora lontani dai valori ideali per la raccolta**.

In campo **resta presente la cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*), con **numerosi esemplari**, soprattutto ninfe di quarta e quinta età. Le **condizioni climatiche** continuano a essere **favorevoli sia all'ovideposizione sia al volo della mosca** dell'olivo (*Bactrocera oleae*). **La tendenza attuale mostra un aumento delle catture** di adulti nelle trappole, sebbene il **quadro rimanga eterogeneo: non in tutti gli oliveti monitorati il numero di mosche è cresciuto**, e in alcune località si registrano ancora valori bassi e stazionari. Nonostante sia stata **rilevata qualche sporadica ovideposizione fertile** negli oliveti monitorati, **non è stata comunque registrata un'infestazione attiva superiore alla soglia d'intervento**. Per quanto riguarda **Euzophera**, le catture di adulti rimangono su **livelli molto contenuti** per entrambe le specie. Si segnala invece un **aumento della presenza di margaronia** (*Palpita unionalis*), sia su piante in produzione sia in giovani oliveti, dove **in alcune località sta causando danni al di sopra della soglia d'intervento**. **Le condizioni climatiche** di questa settimana **sono ancora favorevoli agli attacchi fungini** e si riscontrano sintomi di lebbra solo sulle foglie

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Ci avviciniamo alla **fine del periodo utile per effettuare gli interventi di potatura verde**, finalizzati all'asportazione di polloni e succhioni, sui nuovi impianti e sugli oliveti sottoposti a riforma; quindi, **si consiglia di concludere le operazioni**.

In previsione della raccolta, si consiglia di **proseguire con la normale gestione del cotico erboso**.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Pur essendo l'attacco di mosca dell'olivo sporadico, si **raccomanda** comunque **di verificare** con attenzione la **presenza di eventuali punture di ovideposizione** e, qualora ve ne fossero, di procedere alla **stima dell'infestazione attiva tramite il campionamento di 100 drupe, controllando** con cura sia le punture di ovideposizione sia la **presenza di uova e larve vitali in sviluppo**. Nel caso in cui l'infestazione attiva superi la **soglia d'intervento (3%)**, è possibile **intervenire** con trattamenti a tutta chioma **utilizzando prodotti ovolarvicidi** a base di **flupyradifurone, acetamiprid** e, in **biologico, Azadiractina A**, prestando **particolare attenzione in questa fase ai tempi di carenza** dei prodotti impiegati, optando per i prodotti con tempo più breve.

Si consiglia di **monitorare la presenza di margaronia** (*Palpita unionalis*), **in caso di danno diffuso** sia ai germogli sia alle drupe, è possibile **intervenire con un trattamento a base di Bacillus thuringiensis**, ricordando di acidificare l'acqua utilizzata qualora risulti troppo calcarea. Si precisa inoltre che **margaronia viene controllata anche dagli ovolarvicidi** impiegati per il controllo della **mosca dell'olivo**.

Data la presenza di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie fungine, **resta valido il consiglio**, per chi non l'avesse ancora fatto, di **effettuare un trattamento preventivo a base di prodotti rameici** optando per quelli con tempo di carenza più breve. **Anche in questo caso è opportuno prestare attenzione ai tempi di carenza dei prodotti utilizzati**, poiché con l'avvicinarsi della raccolta la possibilità di intervenire diventa progressivamente più limitata proprio a causa della necessità di rispettare tali tempi.

Nello specchio riportato di seguito vengono riassunti i trattamenti consigliati.

MOSCA DELL'OLIVO	
TRATTAMENTI OVOLARVICIDI (al superamento della soglia 3%)	
CONVENZIONALE	Acetamiprid, Flupyradifurone
BIOLOGICO	Azadiractina A
FUNGHI	
TRATTAMENTI PREVENTIVI	
prodotti rameici (rame ossicloruro, solfato di rame, rame idrossido), usare i prodotti con minore tempo di carenza	
MARGARONIA	
Utilizzo di prodotti a base di Bacillus thuringiensis	



Esemplare di cimice asiatica -areale
Garda



Danni da margaronia su olivo-areale
Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica** prevalente è di **invaiaitura/inolizione**. Il **viraggio di colore** delle drupe **prosegue con intensità variabile** in funzione della cultivar, dell'esposizione e della precocità dei singoli oliveti. Parallelamente continua l'accumulo di olio nella polpa, ormai in fase avanzata.

Le condizioni climatiche del periodo, caratterizzate da temperature più miti e maggiore umidità, continuano a risultare favorevoli all'attività della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) e all'ovideposizione.

Rispetto alla scorsa settimana, nei **monitoraggi effettuati negli oliveti** del Sebino e della Franciacorta si registra un **aumento delle catture di adulti di mosca dell'olivo**. I campionamenti diretti delle drupe evidenziano **tuttavia una situazione ancora complessivamente contenuta**, con **sporadica presenza di larve di prima età**. Il dato conferma la **presenza di ovideposizioni fertili e di infestazioni attive**, ma al momento con **distribuzione limitata e non uniforme sul territorio**. L'aumento delle catture rende comunque **necessario mantenere elevata l'attenzione**, soprattutto negli oliveti più precoci, freschi e umidi e negli appezzamenti nei quali la raccolta è prevista più avanti nella stagione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Concludere le operazioni di **potatura verde**. Continuare con la **normale gestione del cotico erboso**.

CONSIGLI AGRONOMICI

È importante **proseguire con un monitoraggio frequente delle trappole**, verificando l'evoluzione delle catture, e **intensificare il campionamento diretto delle olive**. Nei campioni **è necessario distinguere le punture sterili da quelle fertili** e verificare soprattutto la **presenza di uova e larve vive di prima età**, così da determinare l'**effettiva percentuale di infestazione attiva** e seguirne l'evoluzione.

Negli oliveti gestiti mediante **caolino, zeoliti o altre polveri di roccia**, mantenere una **buona copertura delle drupe** e **ripristinarla qualora risulti compromessa dalle precipitazioni**. Dove viene adottata una **strategia con esche adulticide**, **proseguire** secondo il programma impostato **con prodotti autorizzati a base di spinosad (bio) o cyantraniliprole (convenzionale)**, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta.

Per la **difesa ovo-larvicida**, la **sporadica presenza di larve di prima età** rende particolarmente importante **valutare l'infestazione attiva nei singoli oliveti**. Eventuali interventi non devono essere generalizzati, ma decisi sulla base dei risultati dei campionamenti e delle soglie previste dai disciplinari.

Considerata la fase avanzata della stagione e il progressivo avvicinamento alla raccolta, l'**eventuale utilizzo di prodotti autorizzati a base di acetamiprid o flupyradifurone** dovrà essere attentamente valutato verificando tempi di carenza, numero massimo di applicazioni consentite e data prevista di raccolta.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella dell'**inolizione/invaiatura**.

Ci stiamo avvicinando alla raccolta, le olive stanno accumulando olio in maniera progressiva. Anche **il processo di invaiatura sta accelerando**. Le varietà più precoci stanno virando di colore in maniera diffusa sulla pianta, oltre a quelle sulle cime già totalmente invaiate.

Il numero di catture di adulti di **mosca dell'olivo** si è **mantenuto sui livelli della scorsa settimana**, con la **presenza di alcune punture di ovideposizione**. Nonostante la **pressione di mosca sia aumentata**, attualmente **il fitofago non crea preoccupazioni nella maggior parte dei casi**, con un'infestazione attiva sotto la soglia d'intervento.


SITUAZIONE FITOSANITARIA

Procedere alla normale gestione del cotico erboso, in preparazione alla raccolta.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase fenologica è fortemente consigliato **sospendere i trattamenti insetticidi**, per rispettare i corretti tempi di carenza dei prodotti. Continuare a **monitorare con attenzione la pressione infestante della mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*) e **valutare l'opportunità di un intervento fitosanitario con prodotti ovolarvicidi solo per quegli oliveti** per cui si programma **una raccolta più tardiva**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica - areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal 17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

DEROGA DELTAMETRINA

Si comunica che Regione Lombardia ha autorizzato, per il 2026, un intervento all'anno con Deltametrina su olivo per il controllo di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica). La deroga è valida su tutto il territorio regionale per le aziende che aderiscono a SQNPI, PAC (SRA01) o OCM. Rispettare obbligatoriamente le indicazioni di etichetta.