



olivicoltura
2030

OLIVICOLTURA 2030 BOLLETTINO OLIVO

03.06.2022

Per rimanere aggiornati visitate il sito www.olivicoltura2030.it

GARDA	CONTATTI
Deborah Madernini	3472723570
Paolo Zani	3284933440
Gianbattista Tonni	3349200345
SEBINO	
Luigi Alberti	3408903484
LARIO	
Riccardo Pozzi	3348154399

Supervisione scientifica
Giovanni Minuto - CeRSAA

FASE FENOLOGICA

Fioritura

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

Da piena fioritura, a fine fioritura in funzione delle zone.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si sono riscontrate ovature di cimice nella zona della valtenesi e leggeri danni da parte di Cecidomyia dell'olivo. Dato il periodo si consiglia di iniziare il monitoraggio della mosca dell'olivo con trappole cromotropiche. Si registra negli areali di Toscolano Maderno e Gargnano la presenza di un fitofago, probabilmente un curculionide, la cui larva di colore giallo e capo nero pare sia la responsabile delle vistose erosioni riscontrate negli apici vegetativi che per il momento non alterano l'equilibrio fisiologico della pianta; la situazione è monitorata.

AREALE GARDA

CONSIGLI DI INTERVENTO

In questa fase si consiglia di non effettuare trattamenti fitosanitari.

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

Inizio fioritura - fioritura

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Al momento non si riscontrano particolari problemi di natura fitosanitaria. In alcuni oliveti si può verificare la presenza di cocciniglia mezzo grano di pepe, ma generalmente in quantità trascurabili. Sulle piante si riscontra ancora una scarsa presenza di cimice asiatica, ma si consiglia la massima allerta per quanto riguarda il periodo post fioritura.

AREALE LARIO

CONSIGLI DI INTERVENTO

Al momento si consiglia di non procedere con trattamenti fitosanitari. Le frequenti piogge di questi giorni, diffuse in modo abbastanza omogeneo su tutto l'areale, dovrebbero permettere una buona disponibilità idrica nel terreno per le piante, in caso contrario è opportuno procedere con l'irrigazione di soccorso.

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

Inizio fioritura - fioritura. Si segnala una abbondante fioritura in tutti gli areali monitorati.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Riscontrata la presenza di ovature, neanidi e ninfe di cimice asiatica in alcuni campi monitorati, si consiglia di tenere monitorata la sua presenza. Le abbondanti piogge e l'abbassamento delle temperature hanno favorito la diffusione di cocciniglia cotonosa soprattutto su olivi situati nelle zone più ombreggiate e fresche degli appezzamenti.

AREALE SEBINO

MISURE AGRONOMICHE

Nelle zone dove le precipitazioni sono state scarse, si consiglia di eseguire almeno l'irrigazione di soccorso per favorire la fecondazione e la successiva allegagione. Si ricorda che condizioni di secco e temperatura superiore ai 30°C provocano danni ai fiori e la conseguente caduta senza che avvenga la fecondazione.

Nelle zone aride l'irrigazione di soccorso è utile anche per le giovani piante, come necessario risulta il contenimento delle infestanti per evitare eccessive competizioni con le piantine.

CONSIGLI DI INTERVENTO

Si consiglia di non effettuare interventi fitosanitari in questo periodo.



FASE FENOLOGICA - FIORITURA



LARVA DEL FITOFAGO RINVENUTA NELL'AREALE GARDESANO